

# CASO CLÍNICO

E1 THAÍS BASTOS

# CASO CLÍNICO

---


- 54 anos, masculino.
- Encaminhado pelo setor de uveíte devido a alterações pigmentares em ambos os olhos.
- AP: espondilite anquilosante – em uso de MTX
- AO: episódios prévios de uveíte anterior

# EXAME


---


- AV: 20/20  
20/25P
- TA: 12/14
- BIO: NDN






200  $\mu$ m







IR 30° ART [HR]




OCT 20.0° (6.0 mm) ART (25) Q: 27 [HR]





IR 30° ART [HR]




OCT 20° (5.9 mm) ART (25) Q: 25 [HR]







IR 55° ART [HR]




BAF 55° ART [HR]




FA 0:45.62 55° ART + ICGA 0:45.46 55° ART [HS]




FA 3:09.56 55° ART + ICGA 3:09.40 55° ART [HS]




FA 8:36.75 55° ART + ICGA 8:36.59 55° ART [HS]




IR 55° ART [HR]




BAF 55° ART [HR]




FA 0:18.67 55° ART + ICGA 0:18.51 55° ART [HS]




FA 0:29.90 55° ART + ICGA 0:29.74 55° ART [HS]




FA 5:55.48 55° ART + ICGA 5:55.32 55° ART [HS]



FA 10:45.13 35° ART + ICGA 10:44.97 35° ART [HS]



FA 11:12.38 35° ART + ICGA 11:12.22 35° ART [HS]



# HIPÓTESE DIAGNÓSTICA

---

- EPITELIOPATIA PIGMENTAR PAQUICORÓIDE

# PAQUICORÓIDE

---

- ESPECTRO DE DOENÇAS:

- bilaterais
- aumento da permeabilidade dos vasos da coroide
- aumento do diâmetro dos vasos da camada de Haller
- afinamento da coriocapilar e da camada de Satter

EPITELIOPATIA PAQUICOROIDE

SEROSA CENTRAL

NEOVASCULOPATIA  
PAQUICOROIDE

NEOVASCULARIZAÇÃO TIPO I  
ANEURISMÁTICA (PCV)

SÍNDROME PAQUICOROIDE  
PERIPAPILAR

# PAQUICORÓIDE

---

- PAQUICORÓIDE: 'paqui' – espesso: coróide espessa
  - valor normal: 191 -350
  - corte: 300 micras
  - ALTERAÇÃO NA MORFOLOGIA - espessura varia com a idade, erro refrativo, ritmo circadiano e patologias sistêmicas (HAS)

# Pachychoroid Spectrum

	Pachychoroid pigment epitheliopathy	Central serous chorioretinopathy	Pachychoroid neovascuopathy	Polypoidal choroidal vasculopathy
Clinical	Focal RPE $\Delta$	Serous PED / RD	Type 1 NV	"Polyps"
Fluorescein	Nonspecific $\Delta$ s	Serous PED / RPE leaks	Vascularized PED	"Polyps"
Fundus AF	Focal RPE $\Delta$ s	$\pm$ Gravitating tracks	Non-specific $\Delta$ s	Non-specific $\Delta$ s
ICG angiography	Hyperpermeability		Type 1 NV plaque	BVN / "Polyps"
SD-OCT (EDI)	Thick choroid with centrally dilated Haller vessels = Pachychoroid with pachyvessels			
En face SS-OCT	Pachychoroid and pachyvessels correlate spatially with disease focus			
Angiographic OCT				Type 1 NV $\longrightarrow$ BVN / "Polyps"

# EPITELIOPATIA PAQUICOROIDE

---

- Alterações do EPR vistas no polo posterior acima de locais com aumento da espessura da coróide
- Geralmente assintomáticos
- Pode evoluir para CSC ou desenvolver MNV - acompanhamento

OBRIGADA!

“FELIZ AQUELE  
QUE TRANSFERE O  
QUE SABE E  
APRENDE O QUE  
ENSINA.”

*- Cora Coralina*

