

Observação do Paciente Atitude, locomoção e Fisionomia

Francisco Lotufo Neto

Atitude

- Maneira como o corpo humano está posicionado.
- Observar quando de pé, deambulando, em repouso.
- Pose, posição, postura
- Atitude pode ser normal

Atitudes

- Atitude ereta
- Maioria sem alterações.
- Observar:
 - Corpo penso para a frente ou para os lados
 - Dorso curvado
 - Joelhos fletidos
 - Cabeça reclinada sobre o peito
- Podem indicar passividade, falta de energia, depressão, estupor, astenia

Atitudes


- Atitude ereta
- Observar:
- Paciente dobrado sobre si
 - Histeria, epilepsia, esquizofrenia
- Cabeça inclinada fortemente sobre o peito ou alta com o olhar fixo, tronco imóvel, pescoço rígido, braços colados no corpo, punhos cerrados, pernas distendidas.
 - Catatonia

Atitudes

- Atitude ereta
- Observar:
- Não consegue ficar parado, vai e vem, agita os braços e pernas, lança-se por terra, bate nos móveis.
 - Se animado de irrefreável alegria – mania
 - Preocupado angustiado – alucinações, depressão.
- Atitude altaneira, fendas palpebrais alargadas, tórax dilatado, olham o horizonte e procuram aparentar saúde, força, beleza, superioridade.
 - Delírios de grandeza

Agitação

- O Louco é um personagem com um pouco de cada um de nós (em algum momento).
- Consta que mora num asilo próximo da casa do Cebolinha.
- Por isso vive atazanando o menino. Mas no fundo, no fundo, só provoca situações absurdas, loucas, sem má intenção nenhuma.



Atitudes

- Atitude ereta
- Observar:
- Braços pendidos ao longo do corpo, pés apoiados no bordo externo, dorso curvado, olhar inexpressivo ou desviado do interlocutor, fazendo momices como os símios.
 - Deficiência mental

Atitudes

- Posição sentada
- Pacientes em depressão ou em estado de exaurimento preferem ficar sentados.
- Podem ficar horas, dias inteiros, insensíveis ao frio e calor.
- Indiferentes à sede, fome ou às necessidades corporais.
 - Depressão, estupor, epilepsia, confusão mental, intoxicação, demência.
- Catatônicos recusam sentar ou se sentam, recusam levantar
 - Negativismo

Atitudes

- Posição deitada
- Pacientes que recusam deixar essa posição
- Deitados mas inquietos, clamando, despertos, revolvendo as cobertas, rasgando os lençóis
- Deitados em posição atípica, encolhidos, coxas fletidas sobre a bacia, pernas sobre a coxa.
- Deitados em posição incômoda, com a cabeça fora do colchão, recusam deixar a posição e voltam sempre a ela.

Êxtase

- Pintado em 1615



Hendrick Goltzius

Museum of Fine Arts,
Boston

Bíblia

Daniel - capítulo 13

Atitudes

- Locomoção
- A maioria tem o andar normal
- Caminhar com passos largos, passos cadenciados com participação ativa dos membros superiores, saltos, alterna corrida com o passo, dança, salta sobre uma perna.
 - Mania
- Indecisão nos movimentos, no se levantar e andar, lento, oscilante, tronco curvado, braços inertes, para de andar e titubeia.
 - Depressão

Atitudes

- Locomoção
- Deambular moroso, como autômato, joelhos não se curvam, membros rígidos, cabeça fixa, olhar imóvel.
 - Estupor
- Amaneiramento no andar, rijos, corpo inclinado, caminham ora de flanco, ora na ponta dos pés, saltam, andam para diante e depois para trás, de modo estranho e peculiar.
 - Esquizofrenia catatônica

Atitudes

- Locomoção
- Adotam o modo de deambular do outro, imitam os gestos, passos, trejeitos (ecopraxia).
 - Catatonia
- Caminhar com circunspeção, passo medido, atitude solene, estudada, imponente.
 - Paranoicos

Atitudes

- Locomoção
- Caminhar descuidado, corpo penso para um lado, pés apoiados nos bordos.
 - Deficiência mental, demência
- Marcha insegura, titubeante, lenta
 - Epilepsia logo após uma crise
- Caminhar trejeitos provocantes, ou com hemiparesia, arrastando um dos pés no solo, vacilante.
 - Histeria

Fisionomia

- Foco nas expressões faciais que apontam para o estado de ânimo interno.
 - Fácies vivaz, fatigado, irresoluto, desconfiado, concentrado, enojado, de desprezo ou êxtase.
- Pálpebras semicerradas, olhar fraco e amortecido
 - Demência, apatia
- Repuxamento dos lábios
 - Amargura, afetação, desprezo
- Boca semi-aberta, lábios pendentes, saliva escorrendo
 - Deficiência mental, demência, parkinsonismo,



Almondey Cap' dell' 1840 & 1841

Indigestion.

W. M. 1841 by J. Knight & Co. del.
all by Royal Exchange

Fisionomia

- Hipermimia - Mímica exagerada
 - Alternância rápida e viva de expressões de riso, pranto, cólera, surpresa, ameaça.
- Hipomimia – Diminuição da mímica
 - Lentidão e maior persistência das expressões
- Amimia – Falta de expressão mímica
 - Delírios tóxicos, estupor catatônico e melancólico, demências

Sinal do Ômega e Pregas de Verraguth



Fisionomia

- Paramimia – perversão da mímica
- Mímica dissociada
 - Músculos da face contraem de forma desordenada, dando a expressão fisionômica um aspecto contrário ao estado de ânimo.
- Caretas bizarras e originais estereotipadas
 - Catatônicos e delirantes
- Mímica amaneirada
 - Mímica afetada e artificial.

Fisionomia

- Paramimias
- Estereomímia
 - Repetir durante horas, dias, semanas de modo monótono e desigual, caretas, enrugamento dos supercílios, dilatação das narinas, etc.

Fisionomia

- Riso
- Imotivado
- Franco, sardônico,
- Estulto ou alvar (deficiência mental)
- Rumoroso e desproporcional ao motivo (Mania, deficiência mental, esquizofrenia)
- Clamoroso, desarmônico (paralisia geral)
- Solitário (demência)
- Contínuo

Fisionomia

- Pranto
- Incontido (AVC, Histeria)
- Facilmente provocado (Depressão)
- Contínuo e monótono com gemidos ritmados (ansiosos)
- Incapacidade de chorar e verter uma lágrima (Depressão grave)
- Rumoroso
- Lamurioso

Fisionomia

- Riso e Choro
- Passagem rápida e fácil do riso ao pranto
 - Maníaco enxuga as lágrimas com risadas
 - Paralisia geral passa da jocosidade à dor mais profunda por causa fútil
 - Histeria – suspensão das lágrimas e queixumes quando objetivo é atingido.
- Choro e riso espasmódicos (hemiplegia, lesões corticais que desinibem o tálamo)

Referências

- Pacheco e Silva AC. Exame do doente mental. Oficinas Gráficas da Assistência a Psicopatas. Franco da Rocha, 1953.